NOTE XIX.

PSAMMOECUS NOUVEAUX DU MUSÉE DE LEIDE

PAR

ANTOINE GROUVELLE.

Psammoecus stultus, n. sp.

Breviter oblongus, convexus, nitidulus, pube flava, sublanuginosa vestitus, pilis multo longioribus praecipue ad latera instructus, subsordido-testaceus; antennarum articulis 6—10 *paulatim subinfuscatis,* 11° *subalbido; capite prothoraceque rufo-testaceis; elytris transversim fusco-bimaculatis:* 1ª *macula paulo ante medium, lata, latera haud attingente, in sutura postice longe interrupta,* 2ª *ante apicem, transversa, oblonga, juxta suturam continuata et cum* 1ª *juncta. Antennae breves, incrassatae;* 1° *articulo vix duplo longiore quam latiore,* 2° *subelongato,* 3° *parum elongato,* 4° *et* 5° *subaequalibus quam* 3° *paulo longioribus,* 6° *et* 7° *subelongatis,* 8° *subtransverso,* 9° *et* 10° *quam* 8° *paulatim brevioribus,* 11° *subconico, fere sesquilongiore quam latiore. Caput valde punctatum, punctis ad apicem paulatim sparsioribus, utrinque ad antennae basin vix oblique striolatum, inter antennarum bases vix perspicue striatum; epistomo inflexo, transverso, parce punctulato; labro minimo; fronte inter antennarum bases haud producta; oculis magnis, prominulis, granis minimis; temporibus nullis. Prothorax transversus, antice modice, postice valde angustus, subdense et fortius capite punctatus; margine*

antico arcuato, stricte subpulvinato-marginato; angulis anticis obtusis, hebetatis; lateribus arcuatis, septies denticulatis; 1° *denticulo in angulo postico, minutissimo,* 3° *longissimo, sesquilongiore quam latiore,* 3°—7° *paulatim brevioribus, ultimo in angulo antico posito; angulis posticis obtusis, basi subtruncata, substricte explanato-marginata. Elytra ad basin prothorace duplo latiora, humeris rotundata, lateribus arcuata, ampliata, apice conjunctim rotundata,* 1 *et* $^1/_3$ *tam elongata quam simul in maxima latudine lata, punctato-striata; striis ad latera impressioribus, ad apicem attenuatis, striarum intervallis in disco quam punctis latioribus;* 9° *intervallo laterali lato; marginibus lateralibus medio stricte explanato-marginatis.* — Long. 1, 8 mill.

Ovale, un peu plus de deux fois plus long que large dans sa plus grande largeur, très convexe, un peu brillant, couvert d'une pubescence flave, assez longue, assez dense, sublanugineuse, entremêlée, surtout sur les côtés du prothorax et des élytres, de longs poils dressés, d'un testacé un peu sale; articles 6 à 10 des antennes progressivement enfumés, 11me blanchâtre; tête et prothorax roux-testacés, épaules légèrement enfumées; disque des élytres avec deux taches transversales noirâtres n'atteignant pas les bords latéraux: la 1ère un peu en avant du milieu, large, interrompue en arrière contre la suture sur presque toute la longueur, la 2me avant le sommet, large, en ovale transversal, réunie à la première par une étroite bordure suturale. Antennes courtes, épaisses; 1er article à peine deux fois plus long que large, 2me suballongé, 3me un peu allongé, 4me et 5me subégaux, un peu plus longs que le 3me, 6me et 7me suballongés, 8me subtransversal, 9me et 10me un peu plus courts que le 8me, 11me subconique, environ une fois et demie plus long que large. Tête moins de deux fois plus large que longue, convexe, densément ponctuée sur l'occiput, progressivement plus éparsement et plus faiblement ponctuée vers l'avant, relevée et très brièvement striolée vers la base de chaque antenne, à peine striée entre leurs bases; épistome infléchi, moins de deux fois plus large à

la base que long; labre petit; yeux gros, saillant, à petites facettes; tempes nulles. Prothorax un peu plus étroit en avant que la tête avec les yeux, modérément rétréci en avant, fortement à la base, fortement arrondi sur les côtés, présentant sa plus grande largeur un peu en avant du milieu, un peu plus de deux fois plus large dans sa plus grande largeur que long, couvert d'une ponctuation serrée, plus forte que celle de la tête; bord antérieur un peu arqué, bordé par une étroite marge lisse; angles antérieurs obtus, émoussés; côtés armés de 7 denticules: le 1er à l'angle postérieur, très petit, le 2me aussi long que large à la base à peu près à égale distance du 1er et du 3me, celui-ci un peu plus long que large à la base, les suivants progressivement plus courts, le dernier à l'angle antérieur très petit, 3me et 4me séparés par un intervalle subégal à l'intervalle 2me—3me, les suivants plus rapprochés; angles postérieurs obtus; base subtronquée, bordée par une marge assez étroite, subdéprimée, lisse. Ecusson environ cinq fois moins large que la base du prothorax. Elytres subtronqués à la base, arrondis aux épaules, alors environ deux fois plus larges ensemble que la base du prothorax, arrondis sur les côtés, assez élargis, présentant leur plus grande largeur vers le milieu de la longueur, atténués ensuite vers l'extrémité, arrondis ensemble au sommet, environ une fois et un tiers plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, ponctués-striés; intervalles des stries sur le disque plus larges que les points, subconvexes, intervalles latéraux, surtout le premier, larges; stries suturales devenant contigues à la suture au sommet; ponctuation des stries marginales médiocre, écartée; marges latérales étroitement rebordées-explanées. Prosternum fortement ponctué en avant du sillon latéral des hanches antérieurs, celui-ci bien accentué, atteignant presque le bord latéral. Métasternum longitudinalement sillonné, largement ponctué vers les angles postérieurs. Premier segment de l'abdomen subégal au métasternum, éparsement ponctué, saillant en angle aigu entre les hanches postérieurs. Hanches intermédiaires subcontigues.

Hab. Formose: Akau (Sauter). 4 exemplaires. — Collections du Musée de Leide et A. Grouvelle.

Psammoecus X-notatus, n. sp.

Oblongus, modice convexus, nitidulus, pube flava, subelongata, subtenui, inclinata, subparce vestitus, pilis erectis, multo longioribus praecipue ad latera instructus, ochraceo-testaceus; ultimo antennarum articulo albido, articulis 8—10 *plus minusve infuscatis; singulo elytro transversim bimaculato:* 1ª *macula nigra, juxta medium suturam attingente, ad latus obliqua sat lata, ad suturam stricta, magis obliqua;* 2ª *infuscata, ante apicem, lata, latus haud attingente, juxta suturam stricte continuata et cum* 1ª *juncta. Antennae elongatae, subgraciles:* 1° *articulo ter longiore quam latiore,* 2° *modice elongato,* 3° *sesquilongiore quam latiore,* 4°, 5° *et* 6° *subaequalibus quam* 3° *longioribus,* 7° *et* 8° *subaequalibus quam* 6° *paulo brevioribus,* 9° *et* 10° *subaequalibus parum elongatis,* 11° *subconico, fere duplo longiore quam latiore. Caput valde punctatum, punctis ad apicem paulatim sparsioribus, utrinque ad antennae basin, fere in longitudinem profunde striatum, inter antennarum bases subarcuatim striatum; epistomo vix inflexo, transverso, laevi; labro minimo; oculis prominulis, granis subvalidis; temporibus nullis. Prothorax transversus, antice parum, postice modice angustus, dense et capite fortius punctatus; margine antico utrinque vix sinuato, subpulvinato-marginato; angulis anticis obtusis, haud hebetatis; lateribus rotundatis, septies denticulatis;* 1° *denticulo in postico angulo posito, parum elongato,* 2° *magis ter longiore quam latiore,* 3°—7° *paulatim brevioribus, ultimo in postico angulo sito, minimo; marginibus lateralibus, praecipue ad extremitates explanatis; angulis posticis obtusis; basi arcuata, pulvinato-marginata, utrinque apicem versus subdenticulata. Elytra basi quam prothorax minus duplo latiora, ovata, lateribus arcuata, modice ampliata, apice conjunctim subacuminata, sesquilongiore quam simul latiora, punctato-striata; intervallis striarum in disco punctis vix latioribus;* 1° *intervallo laterali lato;*

marginibus lateralibus medio substricte explanato-marginatis. — Long. 2, 1—2, 3 mill.

Oblong, environ deux fois et demie plus long que large dans sa plus grande largeur, modérément convexe, un peu brillant, couvert d'une pubescence double flave, assez fine, éparse, un peu inclinée, entremêlée principalement sur les côtés du prothorax et des élytres de longs poils dressés, couleur d'un testacé un peu jaunâtre; dernier article des antennes blanchâtre, articles 8 à 10 plus ou moins enfumés; tarses plus clairs que les tibias; sur chaque élytre deux taches transversales, atteignant la suture et s'arrêtant à la marge latérale infléchie: la première presqu'avant le milieu, légèrement inclinée vers la base dans la partie externe, large, un peu rétrécie vers le disque, puis rejoignant la la suture par une bande étroite, fortement oblique en sens inverse; la 2me avant le sommet, moins foncée, large, très faiblement oblique, rejoignant l'extrémité suturale de la 1ère par une étroite bande suturale. Antennes allongées, presque grêles; 1er article trois fois plus long que large, 2me modérément allongé, 3me une fois et demie plus long que large, 4me—6me subégaux, plus longs que 3me, 7me et 8me subégaux, plus courts que 6me, 9me et 10me subégaux, un peu allongés, 11me subconique, presque deux fois plus long que large. Tête environ deux fois plus large que longue, faiblement convexe, couverte d'une ponctuation forte, serrée sur le disque, s'écartant en avant, disparaissant sur l'épistome, longitudinalement et fortement striée-sillonnée de chaque côté presque jusqu'à la base, striée en arc peu marqué entre les bases des antennes, légèrement infléchie en avant; épistome subtrapézoïdal, un peu moins de deux fois plus large à la base que long; labre petit, mais bien visible; yeux gros, saillants, à facettes assez grosses; tempes nulles. Prothorax un peu rétréci en avant, modérément à la base, un peu plus large en avant que la tête y compris les yeux, arqué sur les côtés, présentant son maximum de largeur vers les trois quarts de la longueur à partir de la base, assez nettement deux fois plus large dans sa plus grande

largeur que long, couvert d'une ponctuation serrée, plus forte que celle de l'occiput, transversalement et assez fortement impressionné devant la base; bord antérieur à peine sinué de chaque côté, bordé par un léger bourrelet lisse, obtusément denticulé de chaque côté, avant l'extrémité; angles antérieurs obtus, non émoussés; marges latérales assez largement explanées surtout vers les extrémités, armées chacune de 7 dents étroites: la 1ère à l'angle postérieur très petite, la 2me, plus rapprochée de la 1ère que de la 3me, plus de trois fois plus longue que large à la base, les 3me à 7me progressivement plus courtes, assez rapprochées et assez régulièrement espacées, la 3me plus courte que la 2me, la 7me petite, placée sur l'angle antérieur; angles postérieurs obtus; base subtronquée, bordée par un bourrelet bien marqué, armée de chaque côté, avant l'extrémité d'un très petit denticule. Ecusson égal environ au quart de la longueur de la base du prothorax. Elytres subtronqués à la base, étroitement arrondis aux épaules, arqués sur les côtés, faiblement élargis, présentant leur plus grande largeur un peu au dela du milieu de la longueur, atténués ensuite vers l'extrémité, subacuminés ensemble au sommet, environ une fois et demie plus longs que larges ensemble, assez fortement ponctués-striés; stries à peine atténuées vers l'extrémité; intervalles des stries sur le disque à peine plus larges que les points; 1er intervalle latéral (l'intervalle marginal non compté) plus large que les points; stries suturales subcontigues à la suture au sommet; points des stries marginales assez gros, assez espacés; marges latérales faiblement denticulées dans la partie basilaire, relativement assez largement rebordées-explanées vers le milieu. Prosternum lisse sur le milieu et les marges latérales, fortement ponctué de chaque côté de la partie médiane lisse, strie latérale des hanches antérieures bien marquée, atteignant presque le bord latéral; métasternum très largement ponctué vers les angles postérieurs, longitudinalement sillonné, lisse de chaque côté du sillon; 1er segment de l'abdomen très éparsement ponctué, subégal au métasternum, saillant en

angle aigu entre les hanches postérieures. Hanches intermédiaires contigues.

Hab. Formose: Kosempo et Akau (Sauter). Plusieurs exemplaires. — Collections du Musée de Leide et A. Grouvelle.

Psammoecus major, n. sp.

Oblongo-elongatus, convexus, nitidulus, pube flava, tenui, subelongata, inclinata, subdense vestitus, pilis longioribus praecipue ad latera instructus, ochraceo-testaceus; antennis, capite prothoraceque vix rufescentibus; antennarum articulis 7—10 *subinfuscatis. Antennae subgraciles:* 1° *articulo fere ter longiore quam latiore,* 2° *parum elongato,* 3° *à* 6° *fere sesquilongioribus quam latioribus,* 7° *et* 8° *subquadratis,* 9° *et* 10° *subtransversis,* 11° *modice elongato, apice pulvinato. Caput convexiusculum, praecipue ad basin dense punctatum, in epistomo sublaeve, utrinque ad antennae basin elevatum et breviter striatum, inter antennarum bases tenuiter subarcuatim striatum; epistomo inflexo, transverso; labro magno; oculis prominulis, granis minimis; temporibus indicatis. Prothorax transversus, antice posticeque subaequaliter angustus, lateribus juxta angulos anticos arcuatus, postice subrectus, crebre valdideque punctatus; margine antico arcuato, stricte pulvinato-marginato, angulis anticis rotundatis; lateribus denticulis minimis armatis, tribus ultimis in antico angulo densatis; angulis posticis obtusis; basi subarcuata, substricte pulvinato-marginato. Elytra basi quam prothorax minus duplo latiora; humeris breviter rotundata; lateribus arcuata, modice ampliata, apice conjunctim rotundata, magis duplo longiora quam simul latiora, punctato-striata; striarum intervallis in disco quam punctis haud latioribus, subconvexis; intervallo humerali ad basin subcarinato, laterali lato.* — Long. 3, 5 mill.

Ovale, allongé, très nettement plus de deux fois et demie plus long que large dans sa plus grande largeur, convexe, modérément brillant, couvert d'une pubescence flave, fine, assez dense, peu allongée sur la tête et le prothorax, beaucoup plus longue, inclinée, presque double

sur les élytres, entremêlée surtout sur les côtés de longs poils dressés; couleur jaune testacé; antennes, tête et prothorax faiblement rougeâtres, articles 7 à 10 des antennes légèrement enfumés. Antennes assez grêles; 1er article presque trois fois plus long que large, 2me un peu allongé, 3me à 6me subégaux, presqu'une fois et demie plus longs que larges, 7me et 8me subcarrés, 9me et 10me subtransversaux, 11me environ une fois et demie plus long que large, terminé par un bouton acuminé, pubescent. Tête un peu moins de deux fois aussi longue que large avec les yeux, médiocrement convexe, couverte d'une ponctuation très serrée, un peu moins dense entre les naissances des antennes, presqu'effacée sur l'épistome, relevée et obliquement striolée de chaque côté contre la base de l'antenne, finement striée en arc peu marqué entre ces bases, infléchie en avant de cette strie; épistome trapézoïdale, environ deux fois plus large à la base que long; front, vu de dessus, très légèrement saillant en avant; labre assez grand; yeux moyens, très saillants, facettes petites; tempes marquées. Prothorax à peu près aussi large au sommet qu'à la base, arrondi aux angles antérieurs, presque droit sur les côtés, environ deux fois plus large dans sa plus grande largeur que long, couvert d'une ponctuation très serrée, plus forte que celle de l'occiput; bord antérieur un peu arqué, bordé par un faible bourrelet lisse, obtusément denticulé aux extrémités; côtés armés de 7 très petites dents irrégulièrement espacées: la 1ère sur l'angle postérieur, la 2me un peu plus forte à égale distance de la 1ère et de la 3me, la 3me et la 4me contigues vers le milieu, les trois dernières contigues contre l'angle antérieur, la 6me un peu moins forte que les autres; marges latérales un peu explanées en face des trois denticules antérieurs; angles postérieurs obtus; base un peu arquée, bordée par un bourrelet assez marqué. Ecusson subtriangulaire, environ cinq fois moins large que la base du prothorax. Elytres subsinués à la base, étroitement arrondis aux épaules, alors moins de deux fois plus larges ensemble que la base du

prothorax, arrondis sur les côtés, assez élargis, présentant leur plus grande largeur vers les deux cinquièmes de la longueur, atténués ensuite vers l'extrémité, arrondis ensemble au sommet, ponctués-striés; stries faiblement atténuées au sommet, intervalles discoïdaux à peu près aussi larges que les points; intervalle huméral plus large, convexe, subcaréné à la base, intervalle latéral plus large que les points; points des stries latérales modérément accentués, un peu écartés; marges latérales étroitement rebordées-explanées. Prosternum densément ponctué en avant du sillon latéral des hanches antérieures, lisse sur une bande médiane très étroite; sillon latéral modérément marqué, atteignant le bord latéral assez loin de l'angle antérieur. Métasternum longitudinalement strié, très largement ponctué sur les angles postérieurs. Premier segment de l'abdomen subégal au métasternum, densément ponctué, s'avançant en angle presque droit, émoussé, entre les hanches postérieures. Hanches intermédiaires subcontigues.

Hab. Java: Préanger (Sijthoff). 1 exemplaire. — Musée de Leide.

Psammoecus blandus, n. sp.

Oblongus, subelongatus, convexus, nitidulus, pube flava, parum elongata, tenui, inclinata subdense vestitus, pilis multo longioribus, praecipue ad latera instructus, subochraceo-testaceus; antennarum articulis 6—9 *paulatim infuscatis,* 10° *et* 11° *albidis, capite prothoraceque subrufo-testaceis; singulo elytro medio macula transversa, angulosa, intus quam extus angustiore, latus haud attingente notato, ante apicem leviter subinfuscato. Antennae elongatae, subgraciles;* 1° *articulo fere ter longiore quam latiore,* 2° *parum elongato,* 3° *fere duplo longiore quam latiore,* 4° *et* 6° *subaequalibus, ter longiore quam latiore,* 5° *quam* 6° *longiore,* 7° *sat elongato,* 8° *paulo breviore,* 9° *et* 10° *subquadratis,* 11° *subconico, parum elongato. Caput postice dense, antice subdense, valde punctatum, in epistomo vix punctulatum, utrinque ad antennae basin elevatum et oblique striatum, inter antennarum bases striatum;*

epistomo inflexo, transverso; labro minimo; fronte inter antennarum bases haud producta; oculis prominulis, granis minutis; temporibus nullis. Prothorax transversus, antice vix, postice subvalde angustus, crebre et minus fortiter capite punctatus; margine antico arcuato, medio tenuiter, ad extremitates valde subpulvinato-marginato; angulis anticis obtusis; lateribus arcuatis, antice subparallelis, postice subrectis, marginatis, septies denticulatis: denticulo 1° *in angulo postico, minutissimo,* 2° *minuto,* 3°, 4° *et* 5° *minutissimis,* 6° *et* 7° *parum remotis,* 6° *quam praecedentibus paulo validiore,* 7° *in antico angulo posito; angulis posticis obtusis; basi pulvinato-marginata. Elytra simul post humeris quam prothorace minus duplo latiora, humeris rotundata, lateribus vix ampliata, apice conjunctim rotundata, magis duplo longiora quam simul latiora, punctato-striata; striis ad apicem vix attenuatis; striarum intervallis in disco convexis, quam punctis vix latioribus*; 1° *intervallo laterali lato.* — Long. 2,4 mill.

Oblong, presque trois fois plus long que large dans sa plus grande largeur, convexe, un peu brillant, couvert d'une pubescence fine, un peu allongée, flave, inclinée sur les élytres, alors double et assez serrée, entremêlée surtout sur les côtés du prothorax et des élytres de longs poils dressés; couleur testacé légèrement jaunâtre; tête et prothorax roux-testacés; articles 6 à 9 des antennes progressivement enfumés, 10 et 11 blanchâtres; sur chaque élytre vers le milieu une tache en forme de V renversé, n'atteignant pas le bord latéral, s'appuyant sur la suture, plus étroite sur la branche interne et avant l'extrémité une tache diffuse subenfumée; épaules vaguement subenfumées. Antennes allongées, presque grêles; 1er article presque trois fois plus long que large, 2me un peu allongé, 3me environ une fois et demie plus long que large, 4me et 6me subégaux, trois fois plus longs que larges, 5me un peu plus long que le 6me, 7me assez allongé, 8me un peu plus court, 9me et 10me subcarrés, 11me subconique, un peu allongé. Tête environ deux fois plus large que longue, convexe, densément ponctuée sur l'occiput et le front, presque lisse sur l'épistome,

relevée et obliquement striée à la base des antennes; stries atteignant presque le niveau du milieu de l'orbite de l'oeil; strie interantennaire marquée, faiblement arquée; épistome infléchi, moins de deux fois plus large à la base que long; labre petit; front non saillant en avant entre les bases des antennes; yeux moyens, saillants, à petites facettes; tempes nulles. Prothorax à peine rétréci en avant, modérément à la base, subparallèle au sommet, arrondi sur les côtés en avant, ensuite presque droit jusqu'à la base, environ deux fois plus large en avant que long, couvert d'une ponctuation très serrée, un peu plus faible que celle de la tête; bord antérieur arqué, subdenticulé aux extrémités, bordé par un faible bourrelet lisse, très étroit au milieu, mieux marqué aux extrémités; angles antérieurs obtus; côtés bordés par un très fin bourrelet et par une très étroite marge convexe, armés chacun de sept petits denticules: le premier très petit sur l'angle postérieur, le 2me petit, plus rapproché du 3me que du 1er, les 3me, 4me et 5me très petits, le 3me plus rapproché du 2me que du 4me, le 4me et le 5me modérément écartés, le 6me plus développé que tous les autres, à peu près aussi écarté du 5me que le 1er du 2me, le 7me très petit sur l'angle antérieur; angles postérieurs obtus; base subtronquée, bordée par un bourrelet lisse assez bien marqué et en avant de ce bourrelet par une dépression légèrement concave. Epistome triangulaire, un peu plus large que le quart de la base du prothorax. Elytres subtronqués à la base, assez largement arrondis aux épaules, alors moins larges ensemble que le double de la base du prothorax, oblongs, faiblement arqués sur les côtés, arrondis ensemble au sommet, plus de deux fois plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, ponctués-striés; stries peu atténuées vers le sommet, intervalles discoïdaux convexes, plus larges que les points des stries, 1er intervalle latéral rétréci au milieu, 2me et 3me relativement larges; stries suturales devenant subcontigues à la suture au sommet; ponctuation des stries marginales un peu écartée; marges latérales assez étroitement rebordées

explanées. Prosternum fortement et densément ponctué de chaque côté du milieu, en avant du sillon latéral des hanches antérieures, celui-ci atteignant presque les bords latéraux. Métasternum longitudinalement sillonné, peu largement ponctué vers les angles postérieurs. Premier segment de l'abdomen plus court que le métasternum, assez densément ponctué, s'avançant en angle très obtus entre les hanches postérieures. Hanches intermédiaires subcontigues.

Hab. Java occidental (Fruhstorfer). 1 exemplaire. — Collection du Musée de Leide.

Psammoecus amoenus, n. sp.

Oblongus, modice convexus, nitidus, pube flava, subelongata, tenui, inclinata, subdense vestitus, pilis erectis, multo longioribus praecipue ad latera instructus, ochraceo-testaceus; capite prothoraceque subrufo-testaceis, antennarum articulo 6—10 *paulatim magis infuscatis; singulo elytro nigro bimaculato:* 1ª *macula discoidali, intus subproducta,* 2ª *ante apicem, juxta suturam, strictissima. Antennae elongatae, subgraciles;* 1° *articulo magis duplo longiore quam latiore,* 2° *fere sesquilongiore quam latiore,* 3°—6° *subaequalibus, quam* 2° *longioribus,* 7° *subquadrato,* 8°—10° *subaequalibus, subtransversis,* 11° *subconico, sesquilongiore quam latiore. Caput convexiusculum, dense punctatum, utrinque ad antennae basin subelevatum et substriolatum, inter antennarum bases inflexum et profunde transversim striatum; epistomo transverso, sublaevi; labro minimo; oculis prominulis, granis minimis; temporibus indicatis. Prothorax transversus, antice parum, postice valde angustus, lateribus arcuatus, dense et quam capite paulo fortius punctatus; margine antico subtruncato; angulis anticis obtusis, hebetatis; lateribus septies denticulatis:* 1° *denticulo in postico angulo sito, parum elongato,* 3°—7° *paulatim brevioribus,* 3° *longiore quam basi latiore,* 6° *et* 7° *approximatis, minimis, in antico angulo positis,* 3° *et* 4° *remotissimis; posticis angulis obtusis; basi subtruncata, subbreviter concavo-explanata. Elytra basi prothorace duplo latiora, ovata, lateribus arcuata, ampliata, apice conjunctim*

rotundata, punctato-striata; intervallis striarum in disco punctis latioribus, planis; 1° *intervallo laterali medio vix lato; marginibus lateralibus stricte explanato-marginatis.* — Long. 2,2 mill.

Oblong, environ deux fois et demie plus long que large dans sa plus grande largeur, modérément convexe, brillant, couvert sur les élytres d'une pubescence flave, fine, assez longue, inclinée, assez dense, entremêlée principalement sur les côtés de longs poils dressés, couleur d'un testacé un peu jaunâtre; tête et prothorax très légèrement teintés de roux; articles 6 à 10 des antennes progressivement plus enfumés; sur chaque élytre deux taches noires: la première sur le milieu du disque, moyenne, suborbiculaire, saillante un peu en dedans, la 2me entre la première et le sommet, allongée contre la suture, très étroite. Antennes allongées, presque grêles; 1er article plus de deux fois plus long que large, 2me presqu'une fois et demie aussi long que large, 3me à 6me subégaux, plus longs que le deuxième, 7me subcarré, 8me à 10me subégaux, subtransversaux, 11me subconique, environ une fois et demie plus long que large. Tête environ deux fois plus large que longue, convexe, couverte d'une ponctuation assez dense, faiblement relevée et brièvement striolée de chaque côté vers la naissance de l'antenne, commençant à s'infléchir entre leurs naissances, transversalement et profondément striée; épistome presque lisse, trapézoïdal, presque deux fois plus large à la base que long; labre petit, mais bien visible; yeux moyens, saillants, à petites facettes; tempes arrondies, nettement marquées. Prothorax un peu rétréci en avant, fortement à la base, arrondi sur les côtés, présentant sa plus grande largeur vers les trois quarts de la longueur à partir de la base, moins de deux fois plus large dans sa plus grande largeur que long, couvert d'une ponctuation serrée, plus forte que celle de la tête; bord antérieur tronqué; angles antérieurs obtus, émoussés; côtés armés de 7 denticules un peu relevés: le 1er sur l'angle postérieur petit, 2me un peu plus fort que le 1er, plus

rapproché du 1er que du 3me, 3me à 7me progressivement plus courts, 3me plus long que large à la base, 4me beaucoup plus éloigné du 3me que du 5me, 6me et 7me petits, contigus sur l'angle antérieur; angles postérieurs obtus; base tronquée, bordée par un très étroit bourrelet. Ecusson triangulaire, égal environ au tiers de la longueur de la base du prothorax. Elytres subtronqués à la base, assez largement arrondis aux épaules, alors égaux ensemble au double de la base du prothorax, arrondis sur les côtés, assez élargis, atténués ensuite vers l'extrémité, arrondis ensemble au sommet, un peu moins d'une fois et demie plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, ponctués-striés; stries peu atténuées au sommet, intervalles discoïdaux plus larges que les points; 1er intervalle latéral rétréci vers le milieu; stries suturales devenant contigues à la suture au sommet, points des stries marginales très modérément gros, peu écartés; marges latérales étroitement rebordées-explanées; calus huméraux marqués. Prosternum à ponctuation modérément forte et serrée devant le sillon latéral des hanches antérieures, celui-ci modérément accentué, n'atteignant pas le bord latéral; métasternum longitudinalement sillonné, ponctué vers les angles postérieurs; 1er segment de l'abdomen plus court que le métasternum, éparsement ponctué, saillant en angle aigu entre les hanches postérieures. Hanches intermédiaires subcontigues.

Hab. Annam: Phuc-Son (Fruhstorfer). 1 exemplaire. — Collection du Musée de Leide.

Paris, Décembre 1911.